

ВНИМАНИЕ! ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ

АММИАКОМ

1. Вынесите пострадавшего на свежий воздух, обеспечьте покой.
2. Давайте пить только теплое молоко с боржоми или питьевой водой.
3. Принимайте кодеин по 1 таблетке 2 раза в день.
4. При спазмах горла положите теплую грелку на область шеи. Принимайте теплые водные ингаляции. В домашних условиях дышите воздухом над нагретой кастрюлей с водой.
5. При поражении кожи обильно промойте ее не менее 15 минут водой или 2%-ным раствором борной или лимонной кислоты. В глаза закапать 30%-ный раствор альбурцида, в нос – теплое оливковое или персиковое масло.
6. Делать искусственное дыхание запрещается.

ЗАПОМНИ !


Выходить из зоны заражения необходимо в ватно-марлевой повязке по нижним местам в сторону перпендикулярную направлению ветра

Для обеззараживания (дегазации):

1. территорию обработайте водой и засыпьте местными подручными материалами – сухой измельченной глиной, торфом, песком (толщина слоя засыпки не менее 0,5 см).
2. промойте зараженную поверхность водным раствором хлорной извести или хлорамином, солями гидрохлорида кальция.

**памятка
населению**

ЕСЛИ В ВОЗДУХЕ АММИАК



**Телефоны для
экстренного
реагирования**

Единая служба спасения

112

Скорая помощь

03

АММИАК – при нормальных условиях это бесцветный газ с характерным запахом (нашатырного спирта), почти в 2 раза легче воздуха (его пары поднимаются вверх и передвигаются ветром). При выходе в атмосферу дымит, при обычном давлении затвердевает при -78°C и сжижается при -34°C . С воздухом хорошо растворим в воде, опасен при вдыхании (вызывает поражение дыхательных путей).

Аммиак обладает удушающим и нейротропным действием. Пары сильно раздражают слизистые оболочки и кожные покровы, вызывают жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах, слезотечение. При соприкосновении жидкого аммиака и его растворов с кожей возникает обморожение, жжение, возможен ожог с пузырями, изъязвления.

Признаки отравления аммиаком:

мышечная слабость, нарушение координации движений, приступы судорог, сильное возбуждение, удушье, рвота, спазм голосовых щелей. При легких отравлениях – обильное слезотечение и боль в глазах, сухость першения в горле, чихание и кашель.

ПОМНИТЕ!

С воздухом аммиак образует взрывоопасные смеси в пределах 15-28 объемных процентов.

Транспортировать пострадавшего человека надо в лежачем положении, обеспечив ему тепло и покой.

При отеке легких искусственное дыхание делать нельзя.

После сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

**и речевой информации
о движении облака аммиака**

НЕОБХОДИМО:

1. Использовать укрытия





герметичное защитное сооружение или загерметизировать квартиру - заклеить окна,



вентиляционные отверстия, уплотнить щели в дверях

2. Применить средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)



противогазы

респираторы

ГП-5, ГП-5М,
ГП-7, ГП-7В

• ПДФ-7, ПДФ-Ш,
ПДФ-Ж

• РУ-61М с патронами «КД» или «В»

• камеры защитные детские (до 1,5 лет) - КЗД-4, ИЗД-6

• РПГ-67 с патроном «КД»

• «Снежок - ГП - Е»

3. Или подручные средства



Ватно-марлевая повязка (ВМП)



Шарф




Носовой платок


смоченные в 2%-ном растворе борной, лимонной или уксусной кислоты или смоченные водой.

3. Эвакуироваться

спуститься на нижние этажи (в подвал) здания



или эвакуироваться из района заражения



в овраг, ложину и другую низменность.

СХЕМА ЭВАКУАЦИИ

